

## विभिन्न फसलों पर कीटनाशी के प्रयोग पश्चात् उपज उपयोग की प्रतीक्षा अवधि

फसल	कीटनाशी	मात्रा प्रति हैक्टेयर	छिड़काव का समय	प्रतीक्षा अवधि दिनों में
बाजरा	मोनोक्रोटोफॉस 36 एस. एल.	एक लीटर	कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर	0, दानों 0, दिन चारे में
चवला	मैलाथियॉन 50 ई. सी.	सवा लीटर	फली लगने पर	2, हरी फली के उपयोग हेतु 0, दिन दाना पकने तक
	मोनोक्रोटोफॉस 36 एस. एल.	एक लीटर	फली लगने पर	11, हरी फली के उपयोग हेतु 0, दिन दाना पकने तक
	क्यूनालफॉस 25 ई. सी.	एक लीटर	फूल एवं फली आने पर	5 हरी फली के उपयोग हेतु 0, दिन फसल कटने के बाद दानों में
भिण्डी	मैलाथियॉन 50 ई. सी.	सवा लीटर	फल लगने पर	1, भिण्डी तोड़ने तक
	क्यूनालफॉस 25 ई. सी.	एक लीटर	फल लगने पर	6, भिण्डी तोड़ने तक
	मिथाइल डिमेटॉन 25 ई. सी.	एक लीटर	फल लगने पर	9, फल तोड़ने तक
	डायमिथोएट 30 ई. सी.	एक लीटर	फल लगने पर	7, फल तोड़ने तक

फसल	कीटनाशी	मात्रा प्रति हैक्टेयर	छिड़काव का समय	प्रतीक्षा अवधि दिनों में
टमाटर	डायमिथोएट 30 ई. सी.	एक लीटर	फल लगने पर	7, फल तोड़ने तक
	मैलाथियॉन 50 ई. सी.	सवा लीटर	फल लगने पर	3, फल तोड़ने तक
मिर्ची	मैलाथियॉन 50 ई. सी.	सवा लीटर	फल लगने पर	2, फल तोड़ने तक
	मिथाइल डिमेटॉन 25 ई. सी.	एक लीटर	फल लगने पर	16, फल तोड़ने तक
मूँगफली	क्लोरपायरीफॉस 20 ई. सी.	चार लीटर	प्रथम वर्षा के एक माह पश्चात् सिंचाई के पानी के साथ	0, दिन मूँगफली के दाने में
	क्यूनालफॉस 25 ई. सी.	4 लीटर	प्रथम वर्षा के एक माह पश्चात् सिंचाई के पानी के साथ	0, दिन मूँगफली के दाने में
मूँग	फेनवेलरेट 4% चूर्ण	18.75 किलो	पहला भुरकाव फसल अंकुरण के 30 दिन बाद व दूसरा भुरकाव फली लगने पर	0, फसल कटने के बाद दानों में 10, हरी फली के उपयोग हेतु

फसल	कीटनाशी	मात्रा प्रति हैक्टेयर	छिड़काव का समय	प्रतीक्षा अवधि दिनों में
	डाईमिथोएट 30 ई. सी.	एक लीटर	फूल व फली आते ही	3 दिन फली के उपयोग हेतु 0 दिन मूग की दाल व चारे में
	मोनोक्रोटोफॉस 36 एस. एल.	एक लीटर	फूल व फली आते ही	9, दिन हरी फली उपयोग हेतु